ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA (ANTI-TG)

DESCRIPCION

EXAMEN : Anticuerpos antitiroglobulina
SINONIMO :

Anti- TG

TIPO DE MUESTRA :

Suero/plasma 500 uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

3 dias a 2-8ºC. 1 mes a -20ºC.

INTERFERENCIAS :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día) la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario
TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario
PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Los anticuerpos antitiroglobulina pueden llevar a la destrucción de la glándula tiroides y es más probable que aparezcan después de una lesión o hinchazón (inflamación) de dicha glándula. Los anticuerpos antitiroglobulina también se miden en cualquier momento que se mida el nivel de tiroglobulina; pueden ser detectados en un 40% a 70% de pacientes con tiroiditis crónica; pueden también presentarse en un 70% de pacientes hipotiroideos, en un 40% de pacientes con enfermedad de Graves y un pequeño número de pacientes con otras condiciones autoinmunes, particularmente con anemia perniciosa. Títulos normales de anticuerpos anti-tiroglobulina no excluyen una tiroiditis de Hashimoto.