RUBEOLA IgG – IgM

DESCRIPCION

EXAMEN : RUBEOLA IgG - IgM
SINONIMO :

Sarampión alemán, sarampión de los tres días, IgM/IgG anti-rubéola

TIPO DE MUESTRA :

Suero – Plasma: 500 uL

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

3 semanas de 2–8ºC. 3 meses a -20°C.

INTERFERENCIAS :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (>5 mg/día), la extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración.

DIAS DE PROCESAMIENTO : Diario
TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : Diario
PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere de condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Para conocer si se poseen anticuerpos que protejan frente al virus de la rubéola. Para confirmar una infección antigua o detectar una infección reciente. Antes de un embarazo o al inicio del mismo para confirmar el estado inmunitario. Cuando una mujer embarazada presenta síntomas de rubéola, como fiebre o erupción cutánea. Cuando un recién nacido muestra signos de desarrollo anormal o defectos congénitos que pueden ser atribuidos a una infección intrauterina. Cuando existe la necesidad de confirmar una infección reciente por rubéola o de comprobar el estado inmunitario.